

Інформаційний бюлетень
«ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ»
21 - 26 тижні
(18.05 – 28.06.2026)

Дата випуску:
06.07.2026

www.phc.org.ua
b.com/phc.org.ua



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

Резюме за 21 - 26 тижні по Україні:

- за даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 18 травня до 28 червня 2026 року знаходилися на міжсезонному рівні;
- зареєстровано 567 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), та 515 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин знаходився в межах 1,4% - 2,1%.
- за результатами лабораторних досліджень клінічних зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси грипу типів А та В, SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси, риновіруси, метапневмовіруси, RS-віруси;
- протягом звітного періоду в системі дозорного епідеміологічного нагляду не зареєстровано летальних випадків унаслідок грипу та серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Захворюваність на грип і ГРВІ та моніторинг рівня підвищеної смертності в Європейському регіоні

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (Flu News Europe) станом на 26-й тиждень епідемічного сезону перевищення фонових рівнів захворюваності на грипоподібні захворювання (ГПЗ) зареєстровано лише в Данії. Водночас захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) не перевищувала фонових рівнів епідемічної активності в жодній із країн.

За результатами дослідження клінічних зразків, відібраних від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ в рамках дозорного епідеміологічного нагляду, частка позитивних результатів на віруси грипу залишалася нижчою за епідемічний поріг (менше 10%), частка позитивних зразків на респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) становила близько 1%, а на SARS-CoV-2 – 0%.

За результатами аналізу даних 25 країн Європи, які на 26-му тижні 2026 року брали участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для підтримки прийняття рішень у сфері громадського здоров'я (EuroMOMO), у віковій групі 75 років і старше зареєстровано підвищення смертності від усіх причин. Найвищі значення Z-показника відзначено в Іспанії (4,29), Великій Британії (Англія) (2,29), Франції (2,20) та Ізраїлі (1,75).

Імовірною причиною підвищення смертності серед осіб віком 75 років і старше могли стати аномально високі температури повітря, що спостерігалися в окремих країнах Європи протягом зазначеного періоду.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2026 року зареєстровано 567 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, із них 283 (49,9%) – діти віком до 17 років. З-поміж 567 пацієнтів із ГПЗ у 275 (48,5%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій (рис.1).




Рисунок 1. Розподіл випадків ГПЗ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 21- 26 тижні 2026 року

За результатами лабораторного дослідження 275 клінічних зразків матеріалів в 44 (16%) випадках отримано позитивні результати (табл. 1).

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ
за 21-26 тижні 2026 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS- CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	45						7
Дніпро	39						0
Запоріжжя	12						1
Кропивницький	0						0
Львів	40						0
Одеса	47				1		22
Рівне	8						1
Суми	36						2
Харків	7						1
Чернівці	3	2					0
Чернігів	20						3
Київ	18	1					3
Всього	275	3	0	0	1	0	40

За інформацією, що надали 19 дозорних лікарень, упродовж звітнього періоду зареєстровано 515 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 247 (48%) – діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин протягом 6 тижнів знаходився в межах 1,4% - 2,1% (рис.2).




Рисунок 2. Розподіл випадків ТГРІ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 21- 26 тижні 2026 року

З-поміж 515 випадків ТГРІ у 309 (60%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження в 105 (34%) випадках отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГРІ за 21-26 тижні 2026 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	49						21
Дніпро	20						0
Запоріжжя	20						8
Кропивницький	12						5
Львів	24						0
Одеса	17						8
Рівне	38						15
Суми	13					1	2
Харків	38						11
Чернівці	19						7
Чернігів	22	1					10
Київ	37						16
Всього	309	1				1	103